

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 810/CNTY-CNĐT
V/v sử dụng vắc-xin phòng bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Trạm Chăn nuôi và Thú y Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ;
- Trạm Chăn nuôi và thú y liên quận Tân Bình - Tân Phú - Bình Tân, Phú Nhuận - Bình Thạnh, Quận 12 - Gò Vấp;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Thủ Đức.

Thực hiện Công văn số 4870/BNN-TY ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng vắc-xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các Trạm Chăn nuôi và Thú y thông tin đến các cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn đăng ký nhu cầu sử dụng vắc-xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (nếu có nhu cầu) đăng ký với Trạm Chăn nuôi và Thú y. Trên cơ sở số lượng đăng ký sử dụng vắc-xin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ phối hợp với các Công ty cung ứng vắc-xin để triển khai công tác giám sát tiêm phòng và sau tiêm phòng.

Hiện nay, Cục Thú y đã cấp phép lưu hành đối với 02 loại vắc-xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bao gồm:

- Vắc-xin NAVET-ASFVAC do Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO sản xuất.
- Vắc-xin AVAC ASF LIVE do Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị lãnh đạo các đơn vị có liên quan, thông tin đến các cơ sở chăn nuôi biết để triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Phụ lục về thông tin liên quan đến 02 loại vắc-xin nêu trên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN và PTNT;
- BLĐ CCCNTY;
- Phòng CNĐT;
- Lưu: VT, CNĐT - Thành (15).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Hữu Thiết



PHỤ LỤC

1. **Vắc-xin NAVET-ASFVAC do Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO sản xuất**

- Dạng bào chế: Vắc-xin nhược độc, đông khô.
- Thành phần: Vi-rút Dịch tả lợn Châu Phi nhược độc chủng ASFV-G-Delta-I 177L, chứa ít nhất $10^{2,6}$ HAD₅₀/ liều và chất ổn định sữa không kem.
- Chỉ định: Dùng gây miễn dịch chủ động phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho lợn khỏe mạnh.
- Cách pha vắc-xin: Khi dùng, vắc-xin được pha với dung dịch pha vắc-xin vô trùng đã làm lạnh sao cho 1 ml vắc-xin (hoặc 2 ml vắc-xin) chứa 1 liều vắc-xin đạt hiệu giá vi-rút ít nhất $10^{2,6}$ HAD₅₀
- Đường tiêm: Tiêm bắp thịt.
- Liều tiêm và cách sử dụng: Đối tượng tiêm: Lợn từ 8 đến 10 tuần tuổi. Quy trình tiêm: Tiêm 2 mũi. Tiêm lần đầu 1 liều vắc-xin/ con/ tiêm bắp thịt. Tiêm vắc-xin nhắc lại cùng liều sau mũi một 21 - 30 ngày. Trong trường hợp cần thiết, lợn đang nuôi tại các vùng có bệnh dịch Dịch tả lợn Châu Phi đã và đang lưu hành, nếu muốn tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho các đối tượng lợn khác, cần thiết phải có tư vấn kỹ thuật của nhà sản xuất vắc-xin và cán bộ thú y cơ sở.
- Chống Chỉ Định: Không tiêm cho lợn có thể trạng yếu, đang sốt, bị bệnh mãn tính và ăn uống kém. Không tiêm cho lợn nái, nái mang thai và đực giống.
- Bảo quản: từ 2 đến 8°C, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.
- Quy cách: Lọ 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250 và 500 liều.
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO.
- Nơi sản xuất: Việt Nam.

❖ *Những chú ý khi sử dụng vắc-xin: Chỉ tiêm vắc xin cho lợn khỏe mạnh. Không tiêm cho lợn nái, nái mang thai và đực giống. Không dùng chai vắc-xin đã bị nứt, bật nắp, mất nhãn, nhãn không có số lô - ngày sản xuất - hạn sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, bánh đông khô bị teo. Syringe, kim tiêm và các dụng cụ dùng để tiêm phòng phải được tiệt trùng. Định kỳ thay kim tiêm trong suốt quá trình tiêm phòng. Trong một số ít trường hợp, phụ thuộc vào cá thể, có một tỷ lệ nhỏ lợn sau khi tiêm vắc-xin có thể có phản ứng không như mong muốn (quá mẫn). Trong những trường hợp như vậy, cần thiết phải thông báo cho thú y viên để xử lý kịp thời và khuyến cáo can thiệp bằng Adrenaline kết hợp với các thuốc hỗ trợ điều trị khác. Sau khi pha vắc-xin phải sử dụng hết trong 2 đến 4 giờ. Để đề phòng tai nạn, phải đeo găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ khi thao tác. Tránh để kim tiêm đâm vào tay khi thao tác. Thời gian ngưng sử dụng vắc-xin: 28 ngày.*

2. **Vắc-xin AVAC ASF LIVE do Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất**

- Dạng bào chế: Vắc-xin nhược độc, đông khô.

- Thành phần: Mỗi liều vắc xin chứa tối thiểu $10^{3,5}$ HAD₅₀ vi-rút Dịch tả lợn Châu Phi nhũoc độc chủng MGF và chất bổ trợ đông khô.

- Chỉ định: Dùng để phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho lợn thịt khoẻ mạnh từ 8 đến 10 tuần tuổi trở lên. Sau khi tiêm phòng 4 tuần, lợn có miễn dịch phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thời gian miễn dịch kéo dài ít nhất 4 tháng.

- Đường tiêm: Tiêm bắp thịt.

- Cách dùng và liều lượng: Pha vắc-xin đông khô với dung dịch pha Avac Diluent kèm theo, mỗi liều có thể tích 2 ml. Không pha với các dung dịch khác.

- Liều trình: Tiêm 1 liều vắc-xin cho lợn thịt từ 8 đến 10 tuần tuổi trở lên. Nơi có nguy cơ dịch bệnh cao, có thể tiêm cho lợn thịt đã đủ 4 tuần tuổi.

- Bảo quản: từ 2 đến 8°C, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

- Quy cách: Lọ 5, 10, 20, 25, 50 và 100 liều.

- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

❖ *Những chú ý khi sử dụng vắc-xin: Chỉ sử dụng cho lợn thịt khoẻ mạnh. Không tiêm vắc-xin cho lợn hậu bị, lợn nái và đực giống. Vắc-xin đã pha phải sử dụng ngay trong vòng 2 giờ. Dụng cụ dùng để pha và tiêm vắc-xin phải sạch, vô trùng và không dính các chất tẩy rửa hoặc sát trùng. Không dùng lọ vắc-xin đã bị rạn nứt, biến màu hoặc hết hạn sử dụng.*