

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175 /TY-DT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

V/v hướng dẫn tiêm phòng vắc xin
cúm gia cầm cho chim cút

CHI CỤC THÚ Y TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 383 Kính gửi:
Ngày: 12/2/2014

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

Trong thời gian vừa qua, dịch cúm gia cầm H5N1 đã xảy ra ở chim cút nuôi tại một số tỉnh phía Nam; Cục Thú y đã tiến hành thử nghiệm, đánh giá hiệu lực việc tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đối với chim cút. Căn cứ kết quả thử nghiệm, Cục Thú y hướng dẫn việc sử dụng vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây các ổ dịch cúm gia cầm trên chim cút, cụ thể như sau:

1. Đối với vắc xin H5N1 Re-5:

- Sử dụng để tiêm phòng cho chim cút trong trường hợp xảy ra các ổ dịch cúm gia cầm do vi rút cúm H5N1 nhánh 1.1 gây ra.

- Tiêm 01 mũi cho chim cút trên 2 tuần tuổi, với liều 0,3ml/con.

2. Đối với vắc xin H5N1 Re-6:

- Sử dụng để tiêm phòng cho chim cút trong trường hợp xảy ra các ổ dịch cúm gia cầm do vi rút cúm H5N1 nhánh 2.3.2.1 (nhóm A, B, C) gây ra.

- Tiêm phòng 02 mũi cho chim cút: Tiêm mũi 1 cho chim cút trên 2 tuần tuổi, với liều tiêm là 0,3ml/con; 3 tuần sau khi tiêm mũi 1, tiêm nhắc lại mũi 2 với liều tiêm 0,3 ml/con.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Thú y: Khi có dịch cúm gia cầm xảy ra ở chim cút hoặc gia cầm khác trên địa bàn, chủ động lấy mẫu để xét nghiệm kịp thời, xác định nhánh vi rút để sử dụng vắc xin cho phù hợp trong việc tiêm phòng chim cút.

Trong quá trình chỉ đạo triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông báo về Cục Thú y để phối hợp, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN & PTNT (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, DT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Đàm Xuân Thành